

●内服薬

南九州市

災害時フォーミュラリー 医薬品集

協議後

【循環器系医薬品】

血圧降下薬	医薬品名	規格	用法	備考
Ca拮抗薬	アムロジピン錠	2.5mg 5mg 10mg	通常1日1回	日本フォーミュラリー学会 推奨薬
	ニフェジピンCR錠	10mg 20mg 40mg	通常1日1回	
	ニフェジピнкаプセル	5mg	頓服としても使用 1回10mg 1日3回食後	【備蓄薬局】ちらん薬局 しんまち薬局
ACE阻害薬	エナラプリル錠	2.5mg 5mg 10mg	通常1日1回	
	イミダプリル錠	2.5mg 5mg 10mg	通常1日1回	
ATⅡ阻害薬	アジルサルタン錠	10mg 20mg 40mg	通常1日1回	日本フォーミュラリー 学会推奨
	テルミサルタン錠	20mg 40mg 80mg	通常1日1回	
	カンデサルタン錠	2mg 4mg 8mg 12mg	通常1日1回	
血圧薬配合剤	カムシア配合錠	HD：カンデサルタン8mg アムロジピン5mg	通常1日1回	23,1円
		LD：カンデサルタン8mg アムロピン2.5mg	通常1日1回	23.2円
α1遮断薬	ドキサゾシン錠	0.5mg 1mg 2mg 4mg	1日1回	
βブロッカー	アテノロール錠	25mg 50mg 両方5.9円	通常1日1回	Ccr50 以下は減量 が必要
	ビソプロロール錠	0.65mg 1,25mg 2.5mg 全規格10.1円	通常1日1回	
利尿薬	アゾセミド錠	30mg 60mg		
	フロセミド錠	10mg 20mg 40mg		
	スピロノラクトン錠	25mg. 50mg		
αβ遮断薬	カルベジロール錠	1.25mg、2.5mg、10mg 20mg	【本態性高血圧症（軽症～中等症）、腎実質性高血圧症】成人1回10～20mgを1日1回 【狭心症】通常、成人1回20mgを1日1回 【虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不全】成人1回1.25mg、1日2回食後 【頻脈性心房細動】成人1回5mgを1日1回から開始 1日20mgまで	
低血圧用薬	メトリジン錠	2mg	1日4mg 1日2回	Ⓢ甲状腺機能亢進症 【備蓄薬局】 川辺調剤薬局、しんまち薬局、ナカムラ調剤薬局、そよかぜ薬局
アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)	エンレスト錠	50mg 100mg 200mg	【心不全】 通常、成人には1回50mgを開始用量として1日2回経口投与。忍容性が認められる場合は、2～4週間の間隔で段階的に1回200mgまで増量する。 【高血圧症】 通常、成人には1回200mgを1日1回経口投与。適宜増減可だが、最大投与量は1回400mgを1日1回とする	
冠血管拡張薬	ニコランジル錠	2.5mg 5mg		
	ベラパミル錠	40mg		頓服としても使用

	医薬品名	規格	用法	備考
強心薬	ハーフジゴキシン錠	0.25 mg		
	ニトロペン舌下錠	0.3mg		
抗不整脈薬 I a	シベンズリン (シベノール)	50mg 100mg		抗コリン作用有 低血糖注意
I c	ピルジカイニド	25mg 50mg	1回 50mg を 1日 3回	【備蓄薬局】 川辺調剤薬局、しんまち薬局、ナカムラ調剤薬局、フルーツ調剤薬局、フジ薬局、知覧平和薬局
II βブロッカー	ビソプロロール	0.65mg 1,25mg 2.5mg 全規格 10.1円	上記βブロッカー参照	
	アテノロール	25mg 50mg 両方 5.9円		
III	アミオダロン	50mg 100mg	維持量 200mg を 1～2回	【備蓄薬局】 川辺調剤薬局、しんまち薬局、グリーンティーまさの薬局

	医薬品名	規格	用法	備考
抗血小板薬	バイアスピリン錠	100mg	1日1回	5.7円
	クロピドグレル錠	25mg 50mg 75mg	1日1回	25mg : 10.1~16.0円 50mg : 19.1円 75mg : 21.4円/35.0円
	シロスタゾール OD錠	50mg 100mg	通常、1回 100mg を 1日 2回 なお、年齢・症状により適宜増減	
抗凝固薬	ワーファリン錠	0.5mg 1mg 5mg	1日1回	0.5mg・1mg : 9.8円 5mg : 10.1円
DOAC	リバーロキサバン錠 (イグザレルト)	2.5mg 10mg 15mg 114.4円、 342.9円 476.4円	1日1回 肝臓への影響あり 中等度以上肝障害は禁忌	15 ≤ Ccr < 30 10 mg 分 1 慎重投与 Ccr < 15 禁忌
	アピキサバン (エリキュース)	2.5mg 5mg 117.5円 212.3円	1日2回 80歳以上、 60kg、Cr 1.5以上は減量	Ccr ≤ 15 は禁忌
	エドキサバン錠 (リクシアナ)	15mg 30mg 60mg	1日1回	Ccr 10~50 : 15mg 分 1 Ccr < 10 禁忌

腎排泄の割合は、イグザレルト : 65% エリキュース : 20%

【消化器系医薬品】

PPI	ランソプラゾール OD 錠	15mg 30mg	薬価：12.4 円 20.8 円	腎機能への影響はなし 日本フォーミュラ学会 推奨薬
	エソメプラゾール	10mg 20mg	薬価：24.0 円 41.8 円	
H2 ブロッカー	ファモチジン OD 錠	10mg 20mg 双方ともに 10.1 円	1 日 20～40mg 1 日 1～2 回※	Ccr \geq 50:40mg/日 Ccr10～50:20mg/日 Ccr \leq 10:10mg 分1
消化管機能改善薬	ドンペリドン錠	5mg 10mg	1 日 3 回 食前	腎機能影響なし
	モサプリド錠	5mg	1 日 3 回食前又は食後	腎機能影響なし
胃炎・胃粘膜保護薬	レバミピド錠	100mg	1 日 3 回 食後	腎機能影響なし
健胃薬	つくし AM 散		1 日 3 回 食後	
消化管内ガス排除薬	ジメチコン錠	40mg 80mg	1 日 120～240mg 食後又は食間の 3 回	
鎮痙薬	ブチルスコポラミン錠	10mg	1 回 10～20mg 分 3～5	頓服としても使用
整腸薬	ミヤBM散		1 日 3 回 食後	
緩下剤	酸化マグネシウム錠	250mg 500mg 330mg		
下剤	センノシド錠	12mg		
	ピコスルファートナトリウム内用液		1 回 10～15 滴	
止瀉薬	ロペラミドカプセル			

【消化器系医薬品その他】

肝臓・胆のう	ウルソデオキシコール酸錠	50mg 100mg	1 日 3 回 食後	
	カモスタット錠	100mg	1 日 3 回 食前	
結石溶解薬	ウロカルン配合錠	225mg	1 日 3 回 1 回 2 錠	【備蓄薬局】 川辺調剤薬局、しんまち薬局、ナカムラ調剤薬局、フルーツ調剤薬局、南さつま調剤薬局

【高脂血症・高 TG 血症治療薬】

HMG-COA 阻害薬	ロスバスタチン Ca 錠 日本フォーミュラ学会推奨薬	2.5mg 5mg	1 日 1 回	Ccr 30 mL/分未満では 2.5 mg より開始, 最大 5 mg 分 1
フィブラート系	ベザフィブラート SR 錠	200mg	1 日 1～2 回	Cr 2.0 mg/dL 以上は禁忌
	エゼチミブ錠	10mg	1 日 1 回	

【糖尿病治療薬】

SU剤	グリメピリド錠	0.5mg 1mg 3mg	1日0.5~1mgより開始 1日1~2回	重度腎障害は禁忌 透析患者 NG
ビグアナイド系	メトホルミン錠	250mg 500mg	500~2,250 mg 分2~3 食後	Ccr<45 750mgまで Ccr<30 禁忌 透析患者 OK
αグルコシダーゼ阻害薬	ボグリボース OD 錠 日本フォーミュラ学会推奨薬	0.2mg 0.3mg	1日3回 食直前	透析患者 NG ミグリトール OK
DPP-4 阻害薬	トラゼンタ 日本フォーミュラ学会推奨薬	5mg	1日1回	AUC がやや上昇するが腎機能正常者と同じ 腎肝影響無
	エクア ビルダグリプチン	50mg	1日1回	透析患者でも投与可
速効性インスリン分泌促進薬	レパグリニド 安価 日本フォーミュラ学会推奨薬	0.25mg 0.5mg	分3 食直前(シュアポスト)	
SGLT-2 阻害薬	ジャディアンス錠	10mg 25mg	1日1回	
	フォシーガ錠 多用途	5mg 10mg	5~10mgを1日1回	10mgの用途は注意
糖尿病薬配合錠	イニシンク配合錠	アログリプチン 25mg メトホルミン 500mg	1日1回 135.5 円	Ccr 50以下は NG
	エクメット配合錠	HD: エクア 50mg メトホルミン 500mg	1日2回	HD: 50.2 円
		LD: エクア 50mg メトホルミン 250mg		LD: 51.0 円
	カナリア配合錠	テネリア 20mg カナグル 100mg	1日1回 220.0 円	
スージャヌ配合錠	ジャヌビア 50mg スーグラ 50mg	1日1回 191.7 円		

【高尿酸血症薬】

	医薬品名	規格	用法	備考
XO 阻害薬	フェブキソスタット錠	10mg 20mg 40mg	1日1回 薬価：5.9円、10.7円、19.4円	
尿酸排泄促進剤	ベンズブロマロン錠	25mg 50mg	1日1～3回	
痛風発作改善薬	コルヒチン錠	0.5mg	痛風発作 1日3～4mgを 1日6～8回 予防 1日0.5～1mg	

【泌尿器科用薬】

前立腺肥大症薬	タムスロシン OD 錠	0.1mg 0.2mg	1日1回 12.4円 20.5円	腎機能影響なし
	エブランチルカプセル	15mg 30mg	1日2回	
	シロドシン OD 錠 (ユリーフ®)	2mg 4mg 10.1円 14.5円	1日2回朝夕食後	Ccr50以下は減量
	デュタステリド錠	0.5mg	1日1回	腎機能影響なし
β3 刺激薬	ベオーバ錠	50mg	1日1回	152.7円
過活動膀胱治療薬	ソリフェナシン OD 錠 (ベシケア®)	2.5mg 5mg 22.2円 37.3円	1日1回 1回5mg	抗コリン作用有 Ccr50以下は減量
	イミダフェナシン錠 (ウリトス®、ステーブラ®)	0.1mg 17.8円	1日2回 朝夕	抗コリン作用有 Ccr50以下は減量
コリンエステラーゼ阻害薬	臭化ジスチクミン錠 (ウブレチド®)	5mg	1日5mg	腎機能影響なし

【解熱鎮痛薬】

	医薬品名	規格	用法	備考																	
Nsaid s	カロナール錠	200mg 300mg 500mg	薬価：6.7円 7.0円 11.2円																		
	ロキソプロフェンNa錠	60mg	1日3回 9.8円	重篤な腎障害には禁忌																	
	ジクロフェナクNa錠	25mg	1日3回 5.7円																		
	セレコキシブ錠	100mg 200mg	1日2回 6.1円 10.5円																		
	カロナール細粒	20% <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">体重</th> <th colspan="2">1回量</th> </tr> <tr> <th>アセトアミノフェン</th> <th>細粒20%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5kg</td> <td>50-75mg</td> <td>0.25-0.375g</td> </tr> <tr> <td>10kg</td> <td>100-150mg</td> <td>0.5-0.75g</td> </tr> <tr> <td>20kg</td> <td>200-300mg</td> <td>1.0-1.5g</td> </tr> <tr> <td>30kg</td> <td>300-450mg</td> <td>1.5-2.25g</td> </tr> </tbody> </table>	体重	1回量		アセトアミノフェン	細粒20%	5kg	50-75mg	0.25-0.375g	10kg	100-150mg	0.5-0.75g	20kg	200-300mg	1.0-1.5g	30kg	300-450mg	1.5-2.25g	1日2回 6.1円 10.5円	通常、乳児、幼児及び小児にはアセトアミノフェンとして、体重1kgあたり1回10～15mgを経口投与
体重	1回量																				
	アセトアミノフェン	細粒20%																			
5kg	50-75mg	0.25-0.375g																			
10kg	100-150mg	0.5-0.75g																			
20kg	200-300mg	1.0-1.5g																			
30kg	300-450mg	1.5-2.25g																			
	トアラセット配合錠	〈非がん性慢性疼痛〉1日4回 〈抜歯後疼痛〉1回2錠 max8錠/日																			
神経障害性疼痛薬	プレガバリンOD錠	25mg 75mg 150mg 12.9円 20.9円 31.0円	1日2回	腎機能の程度により減量が必要																	
	タリージェ OD錠	2.5mg 5mg 10mg 15mg 67.2円 92.5円 127.9円 154.8円	1日2回																		
	コルヒチン錠	0.5mg	痛風発作 1日3～4mgを1日6～8回 予防 1日0.5～1mg	Ccr50以下は慎重投与																	
消炎薬	トラネキサム酸錠	250mg 500mg	1日3回																		
筋緊張緩和薬	エペリゾン錠	50mg	1日3回																		

【抗アレルギー薬】

H1 ブロッカー	フェキソフェナジン錠	30mg 60mg 薬価：価格メーカーによる	1日2回	Ccr50～10：分1か2 Ccr10：分1
	レボセチリジンOD錠	2.5mg 5mg	1日1回 就寝前	Ccr50～10：2.5mg
	セレスタミン配合錠 又はその後発品		通常、成人には1回1～2錠を1日1～4回経口投与。 年齢、症状により適宜増減	
	モンテルカスト	5mg 10mg	1日1回	腎機能影響なし

【気管支拡張薬】

	テオフィリン徐放錠	50mg 100mg 200mg	分1～2 200～400mg	腎機能影響なし
β2 刺激薬	ホクナリンテープ	0.5mg、1mg、2mg	1日1枚	

【ステロイド剤】

	プレドニゾン錠	1mg 5mg	通常、成人にはプレドニゾンとして1日5～60mgを1～4回に分割経口投与	
	デカドロン錠	0.5mg	通常成人1日0.5～8mgを1～4回に分割経口投与する ※疾患により用量変化有	【備蓄薬局】 川辺調剤薬局、南さつま調剤薬局、グリーンティーマさの薬局

【感染症用薬】

	医薬品名	規格	用法	備考
インフルエンザ薬	オセルタミビル	75mg	成人及び体重37.5kg以上の小児にはオセルタミビルとして1回75mgを1日2回、5日間経口投与	5日間服用
	オセルタミビルDS		1.33g/10kg（1歳以上） 下記の体重別換算表参照	【備蓄薬局】 川辺調剤薬局、 しんまち薬局、 ナカムラ調剤薬局、 南さつま調剤薬局
漢方薬	ツムラ麻黄湯	1包2.5g		
抗ウイルス薬	バラシクロビル錠	500mg	〈単純疱疹〉 成人には1回500mgを1日2回 〈帯状疱疹〉 成人には1回1000mgを1日3回経口投与	

【感冒用薬】

総合感冒薬	PL顆粒	1g/包	通常、成人には1回1gを1日4回	
漢方薬	ツムラ葛根湯	2.5g/包	1回1包1日3回 食前	
	ツムラ麻黄湯	2.5g/包	1回1包1日3回 食前	
	ツムラ小青竜湯	3g/包	1回1包1日3回 食前	
	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏	2.5g/包	1回1包1日3回 食前	
	ツムラ麻黄附子細辛湯	2.5g/包	1回1包1日3回 食前	
	ツムラ桔梗湯	2.5g/包	1回1包1日3回 食前 うがいとしても	

鎮咳薬	デキストロメトर्फェン錠	15mg	通常 成人1回1～2錠を1日1～4回経口投与	
	フスタゾール糖衣錠	10mg	1日3回 1回1～2錠	
去痰薬	カルボシステイン錠	250mg 500mg	1日3回	
消炎薬	トラネキサム酸	250mg 500mg	1日3回	

《タミフルDS 体重別処方量一覧》

体 重	1日投与量（2分服） ^①		5日間投与量 ^②	体 重	1日投与量（2分服）		5日間投与量
	オセルタミビル (mg) ^③	タミフルDS (g) ^④	タミフルDS (g) ^④		オセルタミビル (mg)	タミフルDS (g)	タミフルDS (g)
9 ^⑤	36 ^⑥	1.20 ^⑦	6.00 ^⑧	25	100	3.33	16.67
10 ^⑤	40 ^⑥	1.33 ^⑦	6.67 ^⑧	28	112	3.73	18.67
12 ^⑤	48 ^⑥	1.60 ^⑦	8.00 ^⑧	30	120	4.00	20.00
13 ^⑤	52 ^⑥	1.73 ^⑦	8.67 ^⑧	33	132	4.40	22.00
15 ^⑤	60 ^⑥	2.00 ^⑦	10.00 ^⑧	35	140	4.67	23.33
18 ^⑤	72 ^⑥	2.40 ^⑦	12.00 ^⑧	36	144	4.80	24.00
20 ^⑤	80 ^⑥	2.67 ^⑦	13.33 ^⑧	37	148	4.93	24.67
23 ^⑤	92 ^⑥	3.07 ^⑦	15.33 ^⑧	④			

【抗生物質】

セフェム系	ケフラーカプセル	250mg	1日3回	【備蓄薬局】 川辺調剤薬局、しんまち薬局、ナカムラ調剤薬局、フルート調剤薬局、知覧平和薬局、ホセイドー薬局
	セフカペンピボキシル錠	100mg	1日3回	
マクロライド系	クラリスロマイシン錠	50mg 200mg	1日1又は2回	
	アジスロマイシン錠	250mg	1日1回	
ペニシリン系	アモキシシリンカプセル	250mg	1日3又は4回	
抗菌薬	レボフロキサシン錠	250mg 500mg	1日1回	

【鎮眩薬】

	ベタヒスチン錠	6mg	1回6～12mg 分3	脳循環改善
	セファドール錠	25mg	1回25～50mg 分3	椎骨脳底動脈血流改善、 前庭神経路調節作用
	アデホスコーク顆粒	10%=100mg=1包	1回100mgを1日3回	

【片頭痛薬】

5-HT 受容体 作動薬	スマトリプタン 薬価：142.1円	50mg	効果が不十分な場合には、2時間以上あけて追加投与可、また、50mgで効果不十分であった場合には、次回片頭痛発現時から100mgを経口投与可。ただし、1日の総投与量を200mg以内とする	
Cach 遮断薬	ミグシス	5mg	1日2回	予防

【止血薬】

	カルバゾクロム スルホン酸 Na 錠	10mg 30mg	成人1日30～90mg 分3	
--	-----------------------	-----------	----------------	--

【甲状腺機能用薬】

機能低下症	チラーヂン S 錠	12.5mg 25mg 50mg 75mg 100mg	1日1回	
機能亢進症	メルカゾール錠	5mg	1日1～4回	

【抗てんかん薬】

	バルプロ酸 NaSR 錠	100mg 200mg		備蓄薬局少数
	カルバマゼピン錠	100mg 200mg		
	レベチラセタム	250mg 500mg	通常、1日1000mgを 1日2回	備蓄薬局少数
	フィコンパ	2mg 4mg	〈単剤療法〉 成人及び4歳以上の小児には 1日1回4～8mgを就寝前。 〈併用療法〉 成人及び12歳以上の小児には、 本剤の代謝を促進する抗てんかん薬を併 用しない場合の維持用量は1日1回4～ 8mg、 併用する場合の維持用量は1日1回8～ 12mgを就寝前	備蓄薬局少数
	ビムパット	50mg 100mg	通常、成人には1日200mg 1日2回 小児：通常、4歳以上の小児に 1日用量として2mg/kg、 体重30kg未満の小児には 1日6mg/kg、体重30kg以上 50kg未満の小児には1日4mg/kg とする。いずれも1日2回	【備蓄薬局】 川辺調剤薬局、 しんまち薬局、 ナカムラ調剤薬局、 南さつま調剤薬局

【認知症用薬】

	ドネペジル OD 錠	3mg 5mg 10mg	1日1回	
	メマンチン OD 錠	5mg 10mg 20mg	1日1回	

【睡眠薬】

超短時間型	トリアゾラム錠	0.125mg 0.25mg		反跳性睡眠注意
短時間型	プロチゾラム錠	0.25mg		
	エチゾラム錠	0.5mg 1mg		
中間型	フルニトラゼパム錠	1mg 2mg		
非ベンゾジア ゼピン系	ゾルピデム錠	5mg 10mg		
	ゾピクロン錠	7.5mg 10mg		
メラトニン R 作動薬	ラメルテオン錠	8mg		
オレキシン R 拮抗薬	デエビゴ錠	2.5mg 5mg 10mg		

【抗不安薬】

短時間型	エチゾラム錠	0.5mg 1mg		
中間型	アルプラゾラム錠	0.4mg		ソラナックス
長時間型	ジアゼパム錠	2mg 5mg 10mg		筋弛緩強
超長時間型	ロフラゼブ酸エチル錠	1mg 2mg		メイラックス

【抗うつ薬】

SSRI	パロキセチン錠	5mg 10mg 20mg	1日1回夕食後	適応で量に変化
	セルトラリン錠	25mg 50mg 100mg	1日1回	適応で量に変化
	フルボキサミン錠	25mg 50mg	1日2回	適応で量に変化
SNRI	デュロキセチン	20mg 30mg	1日1回 朝食後	
NaSSA	ミルタザピン錠	15mg 30mg	1日1回就寝前	
気分安定化薬 (双極性障害 治療薬)	バルプロ酸 Na	100mg 200mg		躁にのみ効果 備蓄薬局少数
	カルバマゼピン錠	100mg 200mg		リチウムがあわない患者に

【精神用薬】 **フォーミュラリ対象外**

	医薬品名	規格	用法	備考
定型 抗精神病薬 (脳内でドパミンのみ抑制)	コントミン錠	12.5mg/25mg/50mg/100mg		
	ヒルナミン錠	5mg 25mg 50mg		
	ハロペリドール錠	0.75mg/1mg/1.5mg/3mg		
	スルピリド錠	50mg 100mg		
	ピーゼットシー錠	2mg 4mg 8mg		
	スピロピタン錠	0.25mg 1mg		
	ニューレプチル錠	5mg 10mg 25mg		
非定型 抗精神病薬	アリピプラゾール錠	3mg 6mg 12mg		
	リスペリドン錠	1mg 2mg 3mg		パーキンソン症状注意
	クエチアピン錠	12.5mg 25mg 50mg 100mg		糖尿病禁忌
	オランザピン錠	2.5mg 5mg 100mg		糖尿病禁忌
	ペロスピロン錠	4mg 8mg		
	ブロナンセリン錠	4mg 8mg		
	インヴェガ	3mg 6mg 9mg		徐放錠
	レキサルティ	1mg 2mg		
	ラツーダ錠	20mg 40mg 80mg		クラリスロマイシン禁忌
	シクレスト舌下錠	5mg 10mg		投与後10分間飲食不可
	チアプリド錠	25mg 50mg	脳梗塞後遺症に伴う攻撃的行動、精神興奮、徘徊、せん妄の改善/特発性ジスキネジア及びパーキンソンニズムに伴うジスキネジア	

【パーキンソン病治療薬】フォーミュラリ対象外

ドパミン遊離促進薬	アマンタジン錠	50mg 100mg	1日 200mg 分2	ドパミン放出促進
レポドパ賦活薬	ゾニサミド OD 錠	25mg 50mg	1日 1回 25mg	レポドパ合成促進
ドパミン R 作動薬	ブロモクリプチン錠	2.5mg	1日 2又は3回	ドパミン受容体刺激
	カバサル錠	0.25mg	1日 1回	
	プラミペキソール錠	0.125mg 0.5mg	1日 2又は3回	
	レキップ CR 錠	2mg 8mg	1日 1回	
		ニュープロパッチ	2.25mg/4.5mg 9mg/13mg	1日 1枚
レポドパ+ベンセラシド	マドパー配合錠 L50		1日 1～3回	レポドパ代謝阻害
レポドパ+カルビドパ	メネシット/ネオドパストン	100mg 250mg	1日 3回	レポドパ代謝阻害
レポドパ+カルビドパ +エンタカボン	スタレボ配合錠	L50 L100	1日 1又は2回	レポドパ代謝阻害
COMT 阻害薬	コムタン錠(エンタカボン)	100mg	1日 1回 単独では用いない	レポドパ代謝阻害
選択的 MAO 阻害薬	セレギリン錠	2.5mg	1日 1～2回	中枢ドパミン代謝阻害
抗コリン薬	アーテン錠 (トリヘキシフェニジル)	2mg	1日 3～4回	ドパミン不足による Ach 量の調節
	ビペリデン錠	1mg	1日 2回	
	ヒベルナ糖衣錠	25mg	1日 25～200mg 1日 1～3回	
アデノシン A _{2A} R 拮抗薬	ノウリアスト錠	20mg	1日 1回	ドパミン不足によるア デノシン量調節
ノルアドレナリン 補充薬	ドプス OD 錠	100mg 200mg	1日 1回又は3回	ドパミン不足によるノ ルアドレナリン補充

【漢方薬】

⑭ ツムラ半夏瀉心湯	1包 2.5g	⑳ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯	1包 2.5g
⑰ ツムラ五苓散	1包 2.5g	㉔ ツムラ十全大補湯	1包 2.5g
⑲ ツムラ小青竜湯	1包 3g	㉘ ツムラ抑肝散	1包 2.5g
㉒ ツムラ加味逍遙散	1包 2.5g	⑥⑩ ツムラ桂枝加芍薬湯	1包 2.5g
㉖ ツムラ麻黄湯	1包 2.5g	⑥⑧ ツムラ芍薬甘草湯	1包 2.5g
㉘ ツムラ麦門冬湯	1包 3g	⑥④ ツムラ大黄甘草湯	1包 2.5g
③⑨ ツムラ苓桂甘湯	1包 2.5g	⑧⑨ ツムラ治打撲一方	1包 2.5g
④⑩ ツムラ猪苓湯	1包 2.5g	100 ツムラ大建中湯	1包 2.5g
④① ツムラ補中益気湯	1包 2.5g	109 ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏	1包 2.5g
④⑤ ツムラ六君子湯	1包 2.5g	126 ツムラ麻子仁丸	1包 2.5g
④⑦ ツムラ釣藤散	1包 2.5g	127 ツムラ麻黄附子細辛湯	1包 2.5g
③② ツムラ人参湯	1包 2.5g		

【小児用薬】 川辺調剤薬局、しんまち薬局で対応 在庫状況で処方修正願ひまたは処方提案あり

	アスベリン散	1歳未満 0.05~0.2g 1歳以上3歳未満 0.1~0.25g 3歳以上6歳未満 0.15~0.4g 成人 0.6~1.2g																	
	カルボシステイン DS	幼・小児に体重 kg 当たり 1回 10mg (本剤 0.02g) 1日 3回経口投与																	
	メプチン DS	4kg : 0.1g、10kg : 0.25g 16kg : 0.4g 6kg : 0.15g、12kg : 0.3g 18kg : 0.45g 8kg : 0.2g 14kg : 0.35g 20kg : 0.5g 6歳以上の小児 1回 25μg (ドライシロップとして 0.5g) を 1日 1回就寝前ないしは 1日 2回 6歳未満の乳幼児には 1回 1.25μg/kg (ドライシロップとして 0.025g/kg) を 1日 2回、朝及び就寝前ないしは 1日 3回、朝、昼及び就寝																	
	レボセチリジン DS	1包 0.5g 分包品 6ヵ月以上1歳未満の小児には 1回 0.25g を 1日 1回、通常、1歳以上7歳未満の小児には 1回 0.25g を 1日 2回、朝食後及び就寝前に通常、7歳以上15歳未満の小児には 1回 0.5g を 1日 2回、朝食後及び就寝前																	
	プランルカスト DS	1日 2回 12kg 以上 18kg 未満 0.5g 18kg 以上 25kg 未満 0.7g 25kg 以上 35kg 未満 1.0g 35kg 以上 45kg 未満 1.4g																	
	テオフィリン DS 20%	小児にテオフィリンとして、1回 4~8mg/kg (本剤 20~40mg/kg) を、1日 2回、朝及び就寝前に経口投与																	
	ミヤBM細粒	通常、成人 1日 1.5~3g を 3回に分割経口投与する。																	
	メトクロプラミド細粒	1日 3回 食前 1日 0.38~0.53mg/kg																	
	ロペミン小児用細粒 0.05%	1包 0.2g 分包品 通常、小児に 1日 0.02~0.04mg/kg (ロペミン小児用細粒 0.05% として 0.04~0.08g/kg) を 2~3回に分割経口投与																	
	デカドロンエリキシル 0.01%	デキサメタゾンとして、通常成人 1日 0.5~8mg を 1~4回に分割経口投与する。小児には 1日 0.15~4mg を 1~4回に分割経口投与する。																	
	カロナール細粒 20%	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">体重</th> <th colspan="2">1回量</th> </tr> <tr> <th>アセトアミノフェン</th> <th>細粒20%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5kg</td> <td>50-75mg</td> <td>0.25-0.375g</td> </tr> <tr> <td>10kg</td> <td>100-150mg</td> <td>0.5-0.75g</td> </tr> <tr> <td>20kg</td> <td>200-300mg</td> <td>1.0-1.5g</td> </tr> <tr> <td>30kg</td> <td>300-450mg</td> <td>1.5-2.25g</td> </tr> </tbody> </table>	体重	1回量		アセトアミノフェン	細粒20%	5kg	50-75mg	0.25-0.375g	10kg	100-150mg	0.5-0.75g	20kg	200-300mg	1.0-1.5g	30kg	300-450mg	1.5-2.25g
体重	1回量																		
	アセトアミノフェン	細粒20%																	
5kg	50-75mg	0.25-0.375g																	
10kg	100-150mg	0.5-0.75g																	
20kg	200-300mg	1.0-1.5g																	
30kg	300-450mg	1.5-2.25g																	

【小児用薬】 川辺調剤薬局、しんまち薬局で対応 在庫状況で処方修正願ひまたは処方提案あり

	ワイドシリン細粒 200mg	1日 20~40mg (力価) /kg を 3~4 回に分割経口投与	
	クラリスロマイシン DS	小児には 1日あたり 10~15mg (力価) /kg を 2~3 回に分けて経口投与する。	

通電状態でない場合(電子秤量器が使用できない場合)において

処方箋応需薬局の在庫状況で処方修正願ひまたは処方提案する場合あり

アスペリンシロップ	1日 3回	1歳未満：1~4mL/日 1歳以上 3歳未満：2~5mL/日 3歳以上 6歳未満：3~8mL/日 成人：12~24mL/日
カルボシステインシロップ	1日 3回	1日量 0.6ml/kg 10kg：6ml/日 15kg：9 ml/日
ザイザルシロップ	6ヶ月~1歳未満：1回 2.5mL 1日 1回 1歳~7歳未満：1回 2.5mL 1日 2回 7歳~15歳未満：1回 5mL (0.5錠) 1日 2回 15歳以上：1回 5mL (1錠) 1日 1回就寝前	

モンテルカストチュアブル錠 5mg キプレスチュアブル錠 5mg	6歳以上の小児：5mg を 1日 1回就寝前に投与	
モンテルカスト細粒 4mg キプレス細粒 4mg	1歳以上 6歳未満の小児に 4mg (本剤 1包) を 1日 1回就寝前に投与	【備蓄薬局】 川辺調剤薬局、しんまち薬局、南さつま調剤薬局、そよかぜ薬局

【ビタミン剤、Ca 剤等その他】

アルファカルシドール錠	0.5mg 1mg	1日 1回	
アレンドロン酸錠	5mg 35mg	1週間に 1回	日本フォーミュラリー学会推奨 【備蓄薬局】 川辺調剤薬局、ちらん薬局、しんまち薬局、ナカムラ調剤薬局、グリーンティーまさの薬局
ミノドロン錠	50mg	月に 1回	
L-アスパラギン酸 Ca 錠	200mg		
ニセルゴリン錠	5mg		
トコフェロールカプセル		1日 3回	
メコバラミン錠	500µg		

球形吸着炭	1包 2g	通常、成人に 1日 6g を 3回に分割	【備蓄薬局】 川辺調剤薬局、フジ薬局、しんまち薬局
クレメジン速崩錠	500mg	通常、成人に 1日 12 を 3回に分割投与	

【婦人科用薬】

PMS・生理痛薬	フリウエルLD/ULD 川辺調剤薬局のみ備蓄	1日 1錠を毎日一定の時刻に 21日間経口投与し、その後 7日間休薬する。以上 28日間を投与 1周期とし、出血が終わっているか続いているかにかかわらず、29日目から次の周期の錠剤を投与し、以後同様に繰り返す。	血栓症注意：喫煙者 前兆伴う偏頭痛患者禁忌
	ヤーズ/ヤーズフレックス 南さつま調剤薬局のみ備蓄	1日 1錠を毎日一定の時刻に定められた順に従って(淡赤色錠から開始する) 28日間連続経口投与する。以上 28日間を投与 1周期とし、出血が終わっているか続いているかにかかわらず、29日目から次の周期の錠剤を投与し、以後同様に繰り返す。	
切迫早産薬	リドトリン錠 5mg しんまち薬局のみ備蓄	1回 1錠を 1日 3回 食後経口投与	【禁忌】 強度の子宮出血、子宮内胎児死亡子癇、「重篤な過敏症、高血圧症、心疾患、糖尿病、肺高血圧症、甲状腺機能亢進症」、常位胎盤早期剥離、妊娠の継続が危険、重篤な前期破水例のうち子宮内感染を合併

●外用薬

協議後

【貼付剤】

	医薬品名	規格	用法	備考
鎮痛・消炎剤	ロキソプロフェンテープ	50mg 100mg	1日1枚	
	ケトプロフェンパップ	30mgのみ	1日2枚	
虚血性心疾患用貼付薬	硝酸イソソルビドテープ	40mg	1日1枚	
気管支拡張薬	ツロブテロールテープ	0.5mg 1mg 2mg	1日1枚	

【塗り薬】

鎮痛・消炎剤	ジクロフェナク Na ゲル	25g/本		
	フェルビナクスチック軟膏	40g/本		
外用ステロイド剤	ジフルプレドナート軟膏 (マイザー軟膏)	5g/本		
	デルモゾール G 軟膏	5g/本		
	ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏 (ロコイド軟膏)	5g/本		
外用非ステロイド剤	アズノール軟膏	20g/本		
抗ウイルス剤	ビダラビン軟膏	5g/本		
口腔用軟膏	デキサメタゾン口腔用軟膏	5g/本		
眼科用軟膏	ネオメドロール EE 軟膏	5g/本		
抗真菌薬外用薬	ルリコンクリーム	10g/本	1日1回	
	ルコナック爪外用薬	10g/本	1日1回	クレナフィンは倍の薬価
抗生物質軟膏	ゲンタマイシン軟膏	10g/本		
痔疾患用軟膏	強力ポステリザン軟膏	2g/本		
	ボラザG軟膏	1容器 2.4g	1日2回朝夕肛門内に注入または塗布	【備蓄薬局】しんまち薬局、ナカムラ調剤薬局、ちらん薬局、フルーツ調剤薬局、南さつま調剤薬局
保湿剤	へパリン類似物質油性クリーム	25g/本		

【座薬】

解熱鎮痛用剤	アルピニー座薬	50mg 100mg 200mg		
消化管運動調節用剤	ナウゼリン坐剤	10mg 30mg	1日2～3回 3歳↓は10mg	
便秘用座薬	新レシカルボン坐剤			
	テレミンソフト坐薬	10mg	【備蓄薬局】川辺調剤薬局、フジ薬局、しんまち薬局、ナカムラ調剤薬局、ちらん薬局、フルーツ調剤薬局、南さつま調剤薬局	常温保管

【点鼻薬】

フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液	27.5 μg	56 噴霧用	1日1回
モメタゾン点鼻液	50 μg	56 噴霧用	1日1回

【吸入薬】

	医薬品名	規格	用法	備考
ステロイド	フルタイド	50 μ g 100 μ g 120 吸入、60 吸入	1 日 2 回	【備蓄薬局】 川辺調剤薬局、 しんまち薬局、 フジ薬局、 南さつま調剤薬局
ステロイド・ β 2	アドエア	50mg 250mg 500mg	1 日 2 回 1 回 1 吸入	【備蓄薬局】しんまち薬 局、川辺調剤薬局、フジ薬 局、ナカムラ調剤薬局、 フルーツ調剤薬局 グリーンティーマさの薬 局
ステロイド・ β 2	フルティフォーム	50 μ g 125 μ g 56 吸入、120 吸入	1 日 2 回 成人 1 回 2 吸入 小児 50 を 1 回 2 吸入	【備蓄薬局】 川辺調剤薬局、しんまち 薬局、フルーツ調剤薬局、 南さつま調剤薬局、クリ ーンティーマさの薬局
ステロイド・ β 2 ・臭化物	テリルジー200 エリ プタ	30 吸入	1 日 1 回 1 吸入	【備蓄薬局】 川辺調剤薬局、しんまち 薬局、南さつま調剤薬局、 ちらん薬局
発作時吸入薬	メプチンエアー	成人 1 回 2 吸入、小児 1 回 1 吸入 1 日 4 回（原則として成人 8 吸入、小児 4 吸入）まで		

【点眼薬】

抗菌薬点眼液	レボフロキサシン点眼液	0.5% 1.5% 5 ml / 本	1 日 3 回	
抗炎症点眼液	フルメトロン点眼液 0.1%	5 ml / 本	1 日 2~4 回点眼す	
	ヒアロンサン点眼液 0.1、0.3	5 ml / 本	1 日 5~6 回	
白内障用点眼液	ピレノキシシン点眼液	5 ml / 本		

緑内障治療点眼薬 ※記載分は参考品目

川辺調剤薬局、しんまち薬局で対応 在庫状況で処方修正願いまたは処方提案あり

房水産生抑制	チモプトール EX 点眼液	0.25% 0.5% 2.5ml / 本	1 日 1 回	
	ミケラン点眼液	LA 2% 1%、2%	1 日 1 回 1 日 2 回	
	ドルゾラミド点眼液	0.5% 1% 5 ml / 本	1 日 3 回	=トルソプト
房水排出促進	ラタノプロスト点眼液	2.5ml / 本		
緑内障配合点眼薬	ミケルナ配合点眼液 (カルテオロール・ラタノプロスト)	5 ml / 本	1 日 1 回	
	コソプト点眼液 (チモプトール・トルソプト)	5 ml / 本	1 日 2 回	2068.5 円 / 本
	アズルガ懸濁点眼液 (プリンゾラミド・チモロール)	5 ml / 本	1 日 2 回	1515 円 / 本
	デュオトラバ (チモプトール・トラバタンズ)	5 ml / 本	1 日 1 回	3385.5 円 / 本
	ザラカムは要冷蔵のため除外			
抗アレルギー	エピナスチン LX 点眼液	5ml / 本	1 日 2 回	薬価：1264.5 円 / 本
眼軟膏	タリビッド眼軟膏	3.5 g / 本	通常、1 日 3 回塗布	【備蓄薬局】川辺調剤薬局、 しんまち薬局、そよかぜ薬局

【含嗽薬】

アズノールうがい液	5ml 10ml	ポピドンヨードうがい液	30ml
-----------	----------	-------------	------

【注射薬】

持続型	インスリン グラルギン BS (遺伝子組換え) (=ランタス注ソロスター)	インスルンデクルデク注 (=トレシーバ注フレックスタッチ)
-----	--	----------------------------------

【日本フォーミュラリ学会推奨】 持続型インスリンは糖尿病診療ガイドライン 2019 など国内外のガイドラインにおいて使い分けが明記されていない。本剤は、インスリン グラルギン (先行品) が多くの臨床試験で用いられており、エビデンスが蓄積していること、高齢者糖尿病診療ガイドライン 2017 に記載されている高齢糖尿病患者における検討では、インスリン デグルデクの重症低血糖の発現はインスリン グラルギンと同様だったと報告されていること、臨床試験で先行バイオ医薬品と同等性が認められたバイオシミラーも選択できることが特徴として挙げられる。インスリン グラルギン BS は有効性・安全性において他剤と差がなく、先行品より安価であることから第一推奨薬とした。

インスリン デグルデク (トレシーバ®注フレックスタッチ)、インスリン デテミル (レベミル®注フレックスペン)
インスリン デグルデク(トレシーバ)は、小児用量が設定されていること、作用持続時間が長く、低血糖の発現がインスリン グラルギンよりも少ないことが報告されていることから、小児やインスリン グラルギンでコントロール不良な患者に使用する。開封後に最長 8 週間まで室温で保存できるため、災害等の理由により冷所で保管できない場合にも利便性が高いことが特徴として挙げられる。

インスリン デテミル(レベミル)は、妊婦に対するエビデンスを有し、医薬品の胎児に対するリスク分類基準のオーストラリア分類で唯一 A とされていることが特徴として挙げられることから、妊婦に使用する場合のオプションとする。

混合型	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	【備蓄薬局】川辺調剤薬局、しんまち薬局、フジ薬局 そよかぜ薬局、グリーンティーマさの薬局
	ヒューマログミックス25注ミリオープン	【備蓄薬局】川辺調剤薬局、しんまち薬局、

速攻型	日本フォーミュラリ学会推奨	
	インスリン リスプロ BS 注 (遺伝子組換え) (=ヒューマログ注ミリオープン)	インスリン アスパルト BS 注 (遺伝子組換え) (=ノボラピッド注フレックスタッチ)
	超速効型インスリンは糖尿病診療ガイドライン 2019 など国内外のガイドラインにおいて使い分けが明記されていない。また、インスリン リスプロ、インスリン アスパルトの有効性・安全性の違いを示した報告はない。本剤は、小児適応を有すること、「妊娠糖尿病」に対する使用が診療報酬支払基金の審査上認められていること、医薬品の胎児に対するリスク分類基準のオーストラリア分類で A とされていること、臨床試験で先行バイオ医薬品と同等性が認められたバイオ後続品であることが特徴として挙げられる。インスリン リスプロは有効性・安全性において他剤と差がなく、先行品より安価である	本剤は、小児適応を有すること、「妊娠糖尿病」に対する使用が診療報酬支払基金の審査上認められていること、医薬品の胎児に対するリスク分類基準のオーストラリア分類で A とされていること、臨床試験で先行バイオ医薬品と同等性が認められたバイオ後続品であることが特徴として挙げられる。インスリン アスパルト BS はインスリン リスプロの先行品および BS のいずれよりも薬価が高いことから、同一成分の先行品からの切替は推奨できるが、新規に投与する場合はインスリンリスプロ製剤の処方推奨される
超速攻型	ノボラピッド注フレックスペン	【備蓄薬局】しんまち薬局、ちらん薬局 南さつま調剤薬局、フジ薬局

持続性 GLP-1 受容体作動薬	トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス	週に1回、皮下注射 忘れた場合は、次回投与までの期間が3日間(72時間)以上であれば気づいた時点で直ちに投与しその後は予め定めた曜日に投与、3日間(72時間)未満であれば投与せず次の予め定めた曜日に投与する	【備蓄薬局】川辺調剤薬局、ちらん薬局 しんまち薬局 南さつま調剤薬局、 クリーンティーマさの薬局
------------------	--------------------------	--	---

ナノパスニードル	33G 34G
----------	---------

【地域医療材料備蓄・供給拠点薬局】

当地域主催の医療材料研修を受講し、かつ高度管理医療機器の許可のある薬局としている。

南九州市 川辺町	しんまち薬局	川辺調剤薬局		
南九州市 知覧町	ナカムラ調剤薬局			

役割：各市において、当該薬局が訪問看護ステーション及び患者様等に対しての医療材料取扱い窓口となり、在宅療養の際に必要な医療材料の相談、供給にあたる。

取り扱い品目リスト

品目	規格	販売単位	税込み価格
シリンジ 針無・横口	20ml、 50ml、	1本 1本	80円 100円
ロックタイプ シリンジ	30ml	1本	80円
サフフィード 吸引カテーテル 先端開口 2孔式	気管内挿入用 30cm 6Fr 口腔・鼻腔用 28cm 10Fr 口腔・鼻腔用 40cm 12Fr 口腔・鼻腔用 50cm 14Fr	1本	60円 80円 100円 100円
カニューレ用ブラシ		1本	250円
自発呼吸用人工鼻サーモベントT		1個	720円
ウロガードプラス(尿バッグ)	閉塞式導尿バッグ/新鮮尿採取口付 逆流防止弁付 2500ml	1個	450円
ストーマパウチ セルケア1・TD	袋サイズ(縦×横)：300mm×150mm	1枚	700円
テガダーム スムーズフィルムロール	幅：15cm	50cm	250円
けんたくボトル	100ml	1個	85円
栄養セット (胃瘻用)		1セット	150円
栄養ボトル	600ml	1個	420円
EN変換コネクタ		1個	200円

●上記以外の品目も随時ご相談に応じます

〈**医材販可**〉のマークが記載されている薬局においても注文受注できますので、上記備蓄品以外の品目もご相談ください。



テルモ ロックタイプシリンジ 《30ml》 80円/本

●緊急避妊薬取り扱い薬局

●南九州市 緊急避妊薬取り扱い薬局

薬局名	連絡先
しんまち薬局	0993-56-1558 / 緊急・夜間 左記→転送
川辺調剤薬局	0993-56-4611 / 緊急・夜間 090-6426-3656
ケーアイ調剤薬局 川辺店	0993-76-5023 / 緊急・夜間 090-9608-1551
知覧平和薬局	0993-58-7950 / 緊急・夜間 左記→転送
グリーンティ調剤 まさの薬局	0993-27-4747 / 緊急・夜間 同一

●一般用医薬品48薬効群常備薬局

(※様々な疾患に対応できる一般用医薬品を常備している薬局)

●南九州市

薬局名	連絡先
しんまち薬局	0993-56-1558 / 夜間 左記→転送
川辺調剤薬局	0993-56-4611 / 夜間 090-6426-3656
ホセイドー薬局	0993-56-0073 / 夜間 同一
ケーアイ調剤薬局	0993-76-5023 / 夜間 同一
南さつま調剤薬局	0993-78-4411 / 夜間 同一
キクナガ薬局	0993-83-2550 / 夜間 同一
グリーンティ まさの薬局	0993-27-4747 / 夜間 同一