

【循環器系医薬品】

血圧降下薬	医薬品名	規格	用法	備考
Ca拮抗薬	アムロジピン錠	2.5mg 5mg 10mg	通常 1日1回	日本フォーミュラリー学会 推奨薬
	ニフェジピンCR錠	10mg 20mg 40mg	通常 1日1回	
	ニフェジピнкаプセル	5mg	頓服としても使用 1回10mg 1日3回食後	【備蓄薬局】さつき薬局、村原薬局、武田調剤薬局、中央調剤薬局、なぎさ薬局、かささ薬局、坊津薬局、海浜薬局
ACE阻害薬	エナラプリル錠	2.5mg 5mg 10mg	通常 1日1回	
	イミダプリル錠	2.5mg 5mg 10mg	通常 1日1回	
AT II阻害薬	アジルサルタン錠	10mg 20mg 40mg	通常 1日1回	日本フォーミュラリー学会推奨
	テルミサルタン錠	20mg 40mg 80mg	通常 1日1回	
	カンデサルタン錠	2mg 4mg 8mg 12mg	通常 1日1回	
血圧薬配合剤	ジルムロ配合錠	HD:アゼルニジピン20mg アムロジピン5mg	通常 1日1回	31.3円
		LD:アゼルニジピン20mg アムロジピン2.5mg	通常 1日1回	30.7円
	カムシア配合錠	HD:カンデサルタン8mg アムロジピン5mg	通常 1日1回	23.1円
		LD:カンデサルタン8mg アムロジピン2.5mg	通常 1日1回	23.2円
α1遮断薬	ドキサゾシン錠	0.5mg 1mg 2mg 4mg	1日1回	
βブロッカー	アテノロール錠	25mg 50mg 両方5.9円	通常 1日1回	Ccr50 以下は減量が必要
	ビソプロロール錠	0.65mg 1.25mg 2.5mg 全規格10.1円	通常 1日1回	
利尿薬	アゾセמיד錠	30mg 60mg		
	フロセמיד錠	10mg 20mg 40mg		
	スピロノラクトン錠	25mg. 50mg		
低血圧用薬	アメジニウム錠 (=リズミック)	10mg	1日20mg 1日2回	Ⓢ 甲状腺機能亢進症 【備蓄薬局】 海浜薬局、村原薬局、大浦薬局、武田調剤薬局、なぎさ薬局、中央調剤薬局、さつき薬局、いろは薬局
アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)	エンレスト錠	50mg 100mg 200mg		【心不全】通常、成人には1回50mgを開始用量として1日2回経口投与。忍容性が認められる場合は、2~4週間の間隔で段階的に1回200mgまで増量する。 【高血圧症】通常、成人には1回200mgを1日1回経口投与。適宜増減可だが、最大投与量は1回400mgを1日1回とする
αβ遮断薬	カルベジロール錠	1.25mg、2.5mg、10mg 20mg		【本態性高血圧症(軽症~中等症)、腎実質性高血圧症】成人1回10~20mgを1日1回 【狭心症】通常、成人1回20mgを1日1回 【虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不全】成人1回1.25mg、1日2回食後 【頻脈性心房細動】成人1回5mgを1日1回から開始 1日20mgまで
冠血管拡張薬	ニコランジル錠	2.5mg 5mg		
	ベラパミル錠	40mg		頓服としても使用

	医薬品名	規格	用法	備考
強心薬	ハーフジゴキシン錠	0125 mg		
	ニトロペン舌下錠	0.3mg		
抗不整脈薬 I a	ジソピラミドカプセル	50mg 100mg	通常、成人1回ジソピラミドとして100mgを1日3回経口投与症状により適宜増減	尿閉(抗コリン作用) 注意
	シベンゾリン (シベノール)	50mg 100mg		抗コリン作用有 低血糖注意
I c	ピルジカイニド	25mg 50mg	1回50mgを1日3回	
	【25mg 備蓄薬局】村原薬局、はんせい薬局、さつき薬局、いろは薬局、武田調剤薬局、なぎさ薬局、坊津薬局 【50mg 備蓄薬局】海浜薬局、はんせい薬局			
II βブロッカー	アテノロール	25mg 50mg 両方 5.9円	通常1日1回	
	ビソプロロール	0.65mg 1,25mg 2.5mg 全規格 10.1円	通常1日1回	
III	アミオダロン	50mg 100mg	維持量200mgを1～2回	
IV	ベプリコール	50mg 100mg	1日2回 【備蓄薬局】海浜薬局、村原薬局、なぎさ薬局	

	医薬品名	規格	用法	備考
抗血小板薬	バイアスピリン錠	100mg	1日1回	5.7円
	クロピドグレル錠	25mg 50mg 75mg	1日1回	25mg : 10.1~16.0円 50mg : 19.1円 75mg : 21.4円/35.0円
	シロスタゾール OD錠	50mg 100mg	通常、1回100mgを1日2回 なお、年齢・症状により適宜増減	
抗凝固薬	ワーファリン錠	0.5mg 1mg 5mg	1日1回	0.5mg・1mg : 9.8円 5mg : 10.1円
	エドキサバン錠 (リクシアナ)	15mg 30mg 60mg	1日1回	Ccr 10~50 : 15mg 分1 Ccr < 10 禁忌

腎排泄の割合は、イグザレルト : 65% エリキユース : 20%

【消化器系医薬品】

協議後

PPI	ランソプラゾール OD 錠	15mg 30mg	薬価：12.4 円 20.8 円	腎機能への影響はなし 日本フォーミュラ学会 推奨薬
	エソメプラゾール	10mg 20mg	薬価：24.0 円 41.8 円	
H2 ブロッカー	ファモチジン OD 錠	10mg 20mg 双方ともに 10.1 円	1 日 20～40 mg 1 日 1～2 回※	Ccr \geq 50:40mg/日 Ccr10～50:20mg/日 Ccr \leq 10:10mg 分1
消化管機能改善薬	ドンペリドン錠	5mg 10mg	1 日 3 回 食前	腎機能影響なし
	モサプリド錠	5mg	1 日 3 回食前又は食後	腎機能影響なし
胃炎・胃粘膜保護薬	レバミピド錠	100mg	1 日 3 回 食後	腎機能影響なし
消化管内ガス排除薬	ジメチコン錠	40mg 80mg	1 日 120～240mg 食後又は食間の 3 回	備蓄薬局少数
鎮痙薬	ブチルスコポラミン錠	10mg	1 回 10～20mg 分 3～5	頓服としても使用
整腸薬	ミヤBM錠		1 日 3 回 食後	
	ミヤBM散		1 日 3 回 食後	
緩下剤	酸化マグネシウム錠	250mg 500mg 330mg		
下剤	センノシド錠	12mg		
止瀉薬	ロペラミドカプセル			

【消化器系医薬品その他】

肝臓・胆のう	ウルソデオキシコール酸錠	50mg 100mg	1 日 3 回 食後	
	カモスタット錠	100mg	1 日 3 回 食前	市内在庫状況△
結石溶解薬	ウロカルン配合錠	225mg	1 日 3 回 1 回 2 錠	【備蓄薬局】 海浜薬局、さつき薬局、 村原薬局、いろは薬局、 なぎさ薬局、田布施薬局

市内在庫状況△・・・市内 2 薬局中、半数以下 9 薬局以上備蓄

【高脂血症・高 TG 血症治療薬】

HMG-COA 阻害薬	ロスバスタチン Ca 錠 日本フォーミュラ学会推奨薬	2.5mg 5mg	1 日 1 回	Ccr 30 mL/分未満では 2.5 mg より開始, 最大 5 mg 分 1
フィブラート系	ベザフィブラート SR 錠	200mg	1 日 1～2 回	Cr 2.0 mg/dL 以上は禁忌
	エゼチミブ錠	10mg	1 日 1 回	

【糖尿病治療薬】

協議後

SU剤	グリメピリド錠	0.5mg 1mg 3mg	1日0.5~1mgより開始 1日1~2回	重度腎障害は禁忌 透析患者 NG
ビグアナイド系	メトホルミン錠	250mg 500mg	500~2,250 mg 分2~3 食後	Ccr<45 750mgまで Ccr<30 禁忌 透析患者 OK
αグルコシダーゼ阻害薬	ボグリボース OD 錠 日本フォーミュラ学会推奨薬	0.2mg 0.3mg	1日3回 食直前	透析患者 NG ミグリトール OK
DPP-4 阻害薬	トラゼンタ 日本フォーミュラ学会推奨薬	5mg	1日1回	AUC がやや上昇するが腎機能正常者と同じ 腎肝影響無
	エクア(先発品) ビルダグリプチン	50mg	1日1回	透析患者でも問題なし
速効性インスリン分泌促進薬	レパグリニド 安価 日本フォーミュラ学会推奨薬	0.25mg 0.5mg	分3 食直前 (=シュアポスト)	【備蓄薬局】 海浜薬局、さつき薬局、 中央調剤薬局、武田調剤薬局、 東本町薬局、 ばんせい薬局
SGLT-2 阻害薬	ジャディアンス錠	10mg 25mg	1日1回	
	フォシーガ錠 多用途	5mg 10mg	5~10mgを1日1回	10mgの用途は注意
糖尿病薬配合錠	エクメット配合錠	HD: エクア 50mg メトホルミン 500mg	1日2回	HD: 50.2 円
		LD: エクア 50mg メトホルミン 250mg		LD: 51.0 円
	トラディアンス配合錠	AP: トラゼンタ 5mg ジャディアンス 10mg	1日1回	AP: 241.5 円
		BP: トラゼンタ 5mg ジャディアンス 25mg		BP: 338.0 円

【高尿酸血症薬】

	医薬品名	規格	用法	備考
XO 阻害薬	フェブキソスタット錠	10mg 20mg 40mg	1日1回 薬価：5.9円、10.7円、19.4円	
尿アルカリ化薬	クエンメット配合錠		1日3回 1回2錠 毎食後	【備蓄薬局】 海浜薬局、村原薬局、 タック調剤薬局、さつき薬 局、武田調剤薬局、いろは 薬局、加世田しんあい薬局 ばんせい薬局、坊津薬局
痛風発作改善薬	コルヒチン錠	0.5mg	痛風発作 1日3～4mgを 1日6～8回 予防 1日0.5～1mg	【備蓄薬局】 海浜薬局、村原薬局、 ハラダ薬局、ほんまち薬局 武田調剤薬局、なぎさ薬 局、中央調剤薬局、 加世田しんあい薬局

【泌尿器科用薬】

前立腺肥大症薬	タムスロシン OD 錠	0.1mg 0.2mg	1日1回 12.4円 20.5円	腎機能影響なし
	エブランチルカプセル	15mg 30mg	1日2回	
	シロドシン OD 錠 (ユリーフ®)	2mg 4mg 10.1円 14.5円	1日2回朝夕食後	Ccr50以下は減量
	デュタステリド錠	0.5mg	1日1回	腎機能影響なし
β3 刺激薬	ベオーバ錠	50mg	1日1回	152.7円
過活動膀胱 治療薬	ソリフェナシン OD 錠 (ベシケア®)	2.5mg 5mg 22.2円 37.3円	1日1回 1回5mg	抗コリン作用有 Ccr50以下は減量
コリンエス テラーゼ 阻害薬	臭化ジスチクミン錠 (ウブレチド®)	5mg	1日5mg	腎機能影響なし

【解熱鎮痛薬】

	医薬品名	規格	用法	備考																	
Nsaid s	カロナール錠	200mg 300mg 500mg	薬価：6.7円 7.0円 11.2円																		
	ロキソプロフェンNa錠	60mg	1日3回 9.8円	重篤な腎障害には禁忌																	
	セレコキシブ錠	100mg 200mg	1日2回 6.1円 10.5円																		
神経障害性疼痛薬	カロナール細粒	20% <table border="1" data-bbox="754 353 1203 526"> <thead> <tr> <th rowspan="2">体重</th> <th colspan="2">1回量</th> </tr> <tr> <th>アセトアミノフェン</th> <th>細粒20%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5kg</td> <td>50-75mg</td> <td>0.25-0.375g</td> </tr> <tr> <td>10kg</td> <td>100-150mg</td> <td>0.5-0.75g</td> </tr> <tr> <td>20kg</td> <td>200-300mg</td> <td>1.0-1.5g</td> </tr> <tr> <td>30kg</td> <td>300-450mg</td> <td>1.5-2.25g</td> </tr> </tbody> </table>	体重	1回量		アセトアミノフェン	細粒20%	5kg	50-75mg	0.25-0.375g	10kg	100-150mg	0.5-0.75g	20kg	200-300mg	1.0-1.5g	30kg	300-450mg	1.5-2.25g		通常、乳児、幼児及び小児にはアセトアミノフェンとして、体重1kgあたり1回10～15mgを経口投与
体重	1回量																				
	アセトアミノフェン	細粒20%																			
5kg	50-75mg	0.25-0.375g																			
10kg	100-150mg	0.5-0.75g																			
20kg	200-300mg	1.0-1.5g																			
30kg	300-450mg	1.5-2.25g																			
	トアラセット配合錠	〈非がん性慢性疼痛〉	1日4回	〈抜歯後疼痛〉1回2錠 max8錠/日																	
	プレガバリン OD 錠	25mg 75mg 150mg 12.9円 20.9円 31.0円	1日2回	腎機能の程度により減量が必要																	
	コルヒチン錠	0.5mg	痛風発作 1日3～4mgを1日6～8回 予防 1日0.5～1mg	Ccr50以下は慎重投与																	
消炎薬	トラネキサム酸錠	250mg 500mg	1日3回																		
筋緊張緩和薬	エペリゾン錠	50mg	1日3回																		

【抗アレルギー薬】

H1 ブロッカー	フェキソフェナジン錠	30mg 60mg 薬価：価格メーカーによる	1日2回	Ccr50～10：分1か2 Ccr10：分1
	オロパタジン OD 錠	2.5mg 5mg	1日2回 妊婦、授乳婦での有効性・安全性が高い	
	セレスタミン配合錠 又はその後発品		通常、成人には1回1～2錠を1日1～4回経口投与。 年齢、症状により適宜増減	
ケミカルメディエーター阻害薬	モンテルカスト	5mg 10mg	1日1回	腎機能影響なし

【気管支拡張薬】

	テオフィリン徐放錠	50mg 100mg 200mg	分 1～2 200～400 mg	腎機能影響なし
β2 刺激薬	ホクナリンテープ	1mg	1日1枚	

【ステロイド剤】

	プレドニゾン錠	1mg 5mg	通常、成人にはプレドニゾンとして1日5～60mgを1～4回に分割経口投与	
	デカドロン錠	0.5mg	通常成人1日0.5～8mgを1～4回に分割経口投与する ※疾患により用量変化有	【備蓄薬局】 海浜薬局、 中央調剤薬局 坊津薬局 ばんせい薬局
	コートリル錠	10mg	通常、成人には1日10～120mgを1～4回に分割して経口投与	【備蓄薬局】 海浜薬局、 中央調剤薬局 村原薬局 武田調剤薬局、 ばんせい薬局

【感染症用薬】

	医薬品名	規格	用法	備考
インフルエンザ薬	オセルタミビル	75mg	成人及び体重 37.5kg 以上の小児にはオセルタミビルとして1回 75mg を1日 2回、5日間経口投与	5日間服用
	オセルタミビル DS		1.33g/10kg (1歳以上) 下記の体重別換算表参照	
漢方薬	ツムラ麻黄湯	1包 2.5g		
抗ウイルス薬	アメナリーフ錠	200mg	【帯状疱疹】 通常、成人にはアメナメビルとして1回 400mg を1日 1回食後に経口投与。 【再発性の単純疱疹】 通常、成人にはアメナメビルとして 1200mg を食後に単回経口投与	空腹時服用では吸収が低下するため食後投与

【感冒用薬】

総合感冒薬	PL 顆粒	1 g/包	通常、成人には1回 1g を1日 4回	
漢方薬	ツムラ葛根湯	2.5g/包	1回 1包 1日 3回 食前	
	ツムラ麻黄湯	2.5g/包	1回 1包 1日 3回 食前	
	ツムラ小青竜湯	3g/包	1回 1包 1日 3回 食前	

鎮咳薬	アストミン錠	10mg	1日 3回 1回 1～2錠	
	フスタゾール糖衣錠	10mg	1日 3回 1回 1～2錠	
去痰薬	カルボシステイン錠	250mg 500mg	1日 3回	
消炎薬	トラネキサム酸	250mg 500mg	1日 3回	

《タミフル DS 体重別処方量一覧》

体 重	1日投与量 (2分服) ^①		5日間投与量 ^②	体 重	1日投与量 (2分服)		5日間投与量
	オセルタミビル (mg) ^③	タミフル DS (g) ^④	タミフル DS (g) ^④		オセルタミビル (mg)	タミフル DS (g)	タミフル DS (g)
9 ^⑤	36 ^⑥	1.20 ^⑦	6.00 ^⑧	25	100	3.33	16.67
10 ^⑤	40 ^⑥	1.33 ^⑦	6.67 ^⑧	28	112	3.73	18.67
12 ^⑤	48 ^⑥	1.60 ^⑦	8.00 ^⑧	30	120	4.00	20.00
13 ^⑤	52 ^⑥	1.73 ^⑦	8.67 ^⑧	33	132	4.40	22.00
15 ^⑤	60 ^⑥	2.00 ^⑦	10.00 ^⑧	35	140	4.67	23.33
18 ^⑤	72 ^⑥	2.40 ^⑦	12.00 ^⑧	36	144	4.80	24.00
20 ^⑤	80 ^⑥	2.67 ^⑦	13.33 ^⑧	37	148	4.93	24.67
23 ^⑤	92 ^⑥	3.07 ^⑦	15.33 ^⑧	④			

【抗生物質】

セフェム系	セフカペンピボキシル錠	100mg	1日3回	
	ケフラルカプセル	250mg	1日3回	【備蓄薬局】海浜薬局、中央調剤薬局、加世田しんあい薬局、アイン薬局
	ケフレックスカプセル	250mg	1回250mg（力価）を6時間ごとに経口投与	【備蓄薬局】海浜薬局、中央調剤薬局、加世田しんあい薬局、アイン薬局
	※セフェム系：供給不安定のため各薬局の在庫状況で処方修正願ひまたは処方提案する場合あり			
マクロライド系	クラリスロマイシン錠	50mg 200mg	1日1又は2回	
	アジスロマイシン錠	250mg	1日1回	
ペニシリン系	アモキシシリンカプセル/サワシリン錠	250mg	1日3又は4回	
抗菌薬	レボフロキサシン錠	250mg 500mg	1日1回	
	ラスビック錠 てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患者は痙攣を起こすおそれがあるので注意	75mg	1日1回 【適応】咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、中耳炎、副鼻腔炎	【備蓄薬局】海浜薬局、村原薬局、クローバー薬局、さつき薬局、武田調剤薬局、東本町薬局、ばんせい薬局、

	バクタ配合錠	〈一般感染症〉通常、成人には日4錠を2回に分割し、経口投与 〈ニューモシスチス肺炎の治療及び発症抑制〉(1)治療に用いる場合：通常、1日量9～12錠を3～4回に分割し、経口投与 (2) 発症抑制に用いる場合：通常、1日量1～2錠を1回、連日又は週3日経口投与	【備蓄薬局】海浜薬局、村原薬局、中央調剤薬局	15≤Ccr≤30 通常の1/2量 Ccr<15 投与しないことが望ましい
--	--------	--	------------------------	---

【鎮眩薬】

	ベタヒスチン錠	6mg	1回6～12mg 分3	脳循環改善
	ジフェニドール錠	25mg	1回25～50mg 分3	椎骨脳底動脈血流改善、前庭神経路調節作用
	アデホスコークワ顆粒	10%=100mg=1包	1回100mgを1日3回	

【片頭痛薬】

5-HT 受容体作動薬	エレクトリプタン (=レルパックス) 薬価：132.8円	20mg	効果が不十分な場合には、2時間以上あけて追加投与可、また、20mgで効果不十分であった場合には、次回片頭痛発現時から40mgを経口投与可。ただし、1日の総投与量を200mg以内とする	半減期長い
-------------	---------------------------------	------	---	-------

【止血薬】

	カルバズクロムスルホン酸Na錠	10mg 30mg	成人1日30～90mg分3	
--	-----------------	-----------	---------------	--

【甲状腺機能用薬】

機能低下症	チラーゼンS錠	12.5mg 25mg 50mg 75mg 100mg	1日1回	
機能亢進症	メルカゾール錠	5mg	1日1～4回	

【抗てんかん薬】

	バルプロ酸 NaSR 錠	100mg 200mg		
	カルバマゼピン錠	100mg 200mg		
	レベチラセタム	250mg 500mg	通常、1日1000mgを1日2回	

【認知症用薬】

	ドネペジル OD 錠	3mg 5mg 10mg	1日1回	
	メマンチン OD 錠	5mg 10mg 20mg	1日1回	

【睡眠薬】

超短時間型	トリアゾラム錠	0.125mg 0.25mg		反跳性睡眠注意
短時間型	ブロチゾラム錠	0.25mg		
	エチゾラム錠	0.5mg 1mg		
中間型	ニトラゼパム錠	5mg 10mg		市内在庫状況△
非ベンゾジアゼピン系	ゾルピデム錠	5mg 10mg		
	ゾピクロン錠	7.5mg 10mg		
	エスゾピクロン錠	1mg 2mg 3mg		
メラトニン R 作動薬	ラメルテオン錠	8mg		市内在庫状況△
オレキシン R 拮抗薬	デエビゴ錠	2.5mg 5mg 10mg		

市内在庫状況△・・・市内22薬局中、半数以下9薬局以上備蓄

【抗不安薬】

短時間型	クロチアゼパム錠	5mg		
	エチゾラム錠	0.5mg 1mg		
中間型	アルプラゾラム錠	0.4mg		ソラナックス
長時間型	ジアゼパム錠	2mg 5mg 10mg		筋弛緩強

【抗うつ薬】

SNRI	デュロキセチン	20mg 30mg	1日1回 朝食後	
気分安定化薬 (双極性障害 治療薬)	バルプロ酸 Na	100mg 200mg		躁にのみ効果
	カルバマゼピン錠	100mg 200mg		リチウムがあわない患者に

【精神用薬】 **フォーミュラリ対象外**

	医薬品名	規格	用法	備考
定型 抗精神病薬 (脳内でドーパミンのみ抑制)	コントミン錠	12.5mg/25mg/50mg/100mg		
	ヒルナミン錠	5mg 25mg 50mg		
	ハロペリドール錠	0.75mg/1mg/1.5mg/3mg		
	スルピリド錠	50mg 100mg		
	ピーゼットシー錠	2 mg 4mg 8mg		
	スピロピタン錠	0.25mg 1mg		
	ニューレプチル錠	5mg 10mg 25mg		
非定型 抗精神病薬	アリピプラゾール錠	3mg 6mg 12mg		
	リスペリドン錠	1 mg 2mg 3mg		パーキンソン症状注意
	クエチアピン錠	12.5mg 25mg 50mg 100mg		糖尿病禁忌
	オランザピン錠	2.5mg 5mg 100mg		糖尿病禁忌
	ペロスピロン錠	4mg 8mg		
	ブロナンセリン錠	4mg 8mg		
	インヴェガ	3mg 6mg 9mg		徐放錠
	レキサルティ	1mg 2mg		
	ラツーダ錠	20mg 40mg 80mg		クラリスロマイシン禁忌
	シクレスト舌下錠	5 mg 10mg		投与後10分間飲食不可
	チアプリド錠	25mg 50mg	脳梗塞後遺症に伴う攻撃的行為、精神興奮、徘徊、せん妄の改善/特発性ジスキネジア及びパーキンソンニズムに伴うジスキネジア	

【パーキンソン病治療薬】 **フォーミュラリ対象外**

ドーパミン遊離促進薬	アマンタジン錠	50mg 100mg	1日 200mg 分2	ドーパミン放出促進
レポドパ賦活薬	ゾニサミド OD 錠	25mg 50mg	1日 1回 25mg	レポドパ生合成促進
ドーパミンR作動薬	プロモクリプチン錠	2.5mg	1日 2又は3回	ドーパミン受容体刺激
	カバサル錠	0.25mg	1日 1回	
	プラミペキソール錠	0.125mg 0.5mg	1日 2又は3回	
	レキップ CR 錠	2mg 8mg	1日 1回	
		ニュープロパッチ	2.25mg/4.5mg 9mg/13mg	1日 1枚
レポドパ+ベンセラシド	マドパー配合錠 L50		1日 1~3回	レポドパ代謝阻害
レポドパ+カルビドパ	メネシット/ネオドパストン	100mg 250mg	1日 3回	レポドパ代謝阻害
レポドパ+カルビドパ +エンタカボン	スタレボ配合錠	L50 L100	1日 1又は2回	レポドパ代謝阻害
COMT 阻害薬	コムタン錠(エンタカボン)	100mg	1日 1回 単独では用いない	レポドパ代謝阻害
選択的 MAO 阻害薬	セレギリン錠	2.5mg	1日 1~2回	中枢ドーパミン代謝阻害
抗コリン薬	アーテン錠 (トリヘキシフェニジル)	2mg	1日 3~4回	ドーパミン不足による Ach 量の調節
	ビペリデン錠	1mg	1日 2回	
	ヒベルナ糖衣錠	25mg	1日 25~200mg 1日 1~3回	
アデノシン A _{2A} R 拮抗薬	ノウリアスト錠	20mg	1日 1回	ドーパミン不足によるア デノシン量調節
ノルアドレナリン 補充薬	ドプス OD 錠	100mg 200mg	1日 1回又は3回	ドーパミン不足によるノ ルアドレナリン補充

【漢方薬】

①ツムラ葛根湯	1包 2.5g
⑱ツムラ五苓散	1包 2.5g
⑲ツムラ小青竜湯	1包 3g
⑳ツムラ麻黄湯	1包 2.5g

㉑ツムラ麦門冬湯	1包 3g
㉒ツムラ補中益気湯	1包 2.5g
㉓ツムラ抑肝散	1包 2.5g
100 ツムラ大建中湯	1包 2.5g

【小児用薬】 ★小児の処方対応可能薬局★

海浜薬局、いろは薬局、なぎさ薬局、村原薬局、クローバー薬局
(南九州市は、川辺調剤薬局、しんまち薬局が対応可)

アスピリン散	1歳未満 0.05~0.2g 成人 0.6~1.2g 1歳以上3歳未満 0.1~0.25g 3歳以上6歳未満 0.15~0.4g
カルボシステイン DS	幼・小児に体重 kg 当たり 1回 10mg (本剤 0.02g) 1日3回経口投与
メプチン DS	4kg : 0.1g、10kg : 0.25g 16kg : 0.4g 6kg : 0.15g、12kg : 0.3g 18kg : 0.45g 8kg : 0.2g 14kg : 0.35g 20kg : 0.5g 6歳以上の小児 1回 25μg (ドライシロップとして 0.5g) を 1日1回 就寝前ないしは 1日2回 6歳未満の乳幼児には 1回 1.25μg/kg (ドライシロップとして 0.025g/kg) を 1日2回、朝及 び就寝前ないしは 1日3回、朝、昼及び就寝
レボセチリジン DS	1包 0.5g 分包品 6ヵ月以上1歳未満の小児には 1回 0.25g を 1日1回、 通常、1歳以上7歳未満の小児には 1回 0.25g を 1日2回、朝食後及 び就寝前に通常、7歳以上15歳未満の小児には 1回 0.5g を 1日2回、朝食後及び就寝前
プラナルカスト DS	1日2回 12kg以上18kg未満 0.5g 18kg以上25kg未満 0.7g 25kg以上35kg未満 1.0g 35kg以上45kg未満 1.4g
テオフィリン DS 20%	小児にテオフィリンとして、1回 4~8mg/kg (本剤 20~40mg/kg) を、1日2回、朝及び就寝前に経口投与
ミヤBM細粒	通常、成人 1日 1.5~3g を 3回に分割経口投与する。
ナウゼリン DS	1日 1.0~2.0mg/kg を 1日3回食前に投与 【備蓄薬局】海浜薬局、さつき薬局
ロペミン小児用細粒 0.05%	1包 0.2g 分包品 通常、小児に 1日 0.02~0.04mg/kg (ロペミン小児用細粒 0.05% として 0.04~0.08g/kg) を 2~3回に分割経口投与
デカドロンエリキシル 0.01%	デキサメタゾンとして、通常成人 1日 0.5~8mg を 1~4回に分割 経口投与する。小児には 1日 0.15~4mg を 1~4回に分割経口投 与する。

【小児用薬】 ★小児の処方対応可能薬局★

海浜薬局、いろは薬局、なぎさ薬局、村原薬局、クローバー薬局

ワイドシリン細粒 200mg	1日 20~40mg (力価) / kg を 3~4回に分割経口投 与	
クラリスロマイシン DS	小児には 1日あたり 10~15mg (力価) / kg を 2~3回 に分けて経口投与する。	
セフジトレンピボキシル		
セフカペンピボキシル		
セファレキシン DS		【備蓄薬局】村原薬局
ケフラール細粒		【備蓄薬局】海浜薬局

※各薬局の在庫状況で処方修正願ひまたは処方提案する場合あり

通電状態でない場合(電子秤量器が使用できない場合)において

処方箋応需薬局の在庫状況で処方修正願いまたは処方提案する場合あり

アスベリンシロップ	1日3回	1歳未満：1～4mL/日 3歳以上6歳未満：3～8mL/日 1歳以上3歳未満：2～5mL/日 成人：12～24mL/日
カルボシステインシロップ	1日3回	1日量 0.6ml/kg 10kg：6ml/日 15kg：9ml/日
ザイザルシロップ	6ヶ月～1歳未満：1回2.5mL 1歳～7歳未満：1回2.5mL 7歳～15歳未満：1回5mL (0.5錠) 15歳以上：1回5mL (1錠)	1日1回 1日2回 1日2回 1日1回就寝前

モンテルカストチュアブル錠 5mg キプレスチュアブル錠 5mg	6歳以上の小児：5mgを1日1回 就寝前に投与	
モンテルカスト細粒 4mg キプレス細粒 4mg	1歳以上6歳未満の小児に4mg(本 剤1包)を1日1回就寝前に投与	【備蓄薬局】海浜薬局、村原薬局、 南さつまマリンバ薬局、クローバー 薬局、ばんせい薬局、なぎさ薬局

【ビタミン剤、Ca剤等その他】

アルファカルシドール錠	0.5mg 1mg	1日1回	
エルデカルシトール	0.5mg 0.75mg	1日1回	
アレンドロン酸錠	5mg 35mg	1週間に1回	日本フォーミュラー 学会推奨
L-アスパラギン酸 Ca 錠	200mg		
アスパラカリウム錠	300mg		
ニセルゴリン錠	5mg		
トコフェロールカプセル		1日3回	
メコバラミン錠	500μg		

球形吸着炭	1包2g	通常、成人に1日6gを3回に分割
クレメジン速放錠	500mg	通常、成人に1日12を3回に分割投与

【婦人科用薬】

PMS・ 生理 痛薬	フリウエルLD/ULD ※海浜薬局のみ備蓄	1日1錠を毎日一定の時刻に21日間経口投与し、その後7日間休薬する。以上28日間を投与1周期とし、出血が終わっているか続いているかにかかわらず、29日目から次の周期の錠剤を投与し、以後同様に繰り返す。	血栓症注意：喫煙者 前兆伴う偏頭痛患者禁忌
	ヤーズ/ヤーズフレックス ※海浜薬局、村原薬局のみ 備蓄	1日1錠を毎日一定の時刻に定められた順に従って(淡赤色錠から開始する)28日間連続経口投与する。以上28日間を投与1周期とし、出血が終わっているか続いているかにかかわらず、29日目から次の周期の錠剤を投与し、以後同様に繰り返す。	
切迫 早産 薬	ズファジラン錠 10mg (β2受容体刺激 子宮平滑筋弛緩) ※海浜薬局、ばんせい薬局、 大浦薬局のみ備蓄	〈循環器領域の適応〉 通常成人1回10～20mgを1日3～4回 〈子宮収縮の抑制〉 通常1日量30～60mgを3～4回 〈月経困難症〉 通常1回10～20mgを1日3～4回	
	リドトリン錠 5mg ※海浜薬局、村原薬局、 アイン薬局のみ備蓄	1回1錠を1日3回食後経口投与	強度の子宮出血、子宮内胎児死亡 子痛、「重篤な過敏症、高血圧症、心疾患、 糖尿病、肺高血圧症、甲状腺機能亢進症」、常位 胎盤早期剥離、妊娠の継続が危険、重篤な前期破 水例のうち子宮内感染を合併

●外用薬

協議後

【貼付剤】

	医薬品名	規格	用法	備考
鎮痛・消炎剤	ロキソプロフェン Na テープ	50mg 100mg	1日1枚	
	※パップ剤は各薬局の在庫状況で処方修正願ひまたは処方提案の可能性あり [ロキソプロフェン Na パップ 100mg、フルビプロフェンパップ 80mg(=ゼボラ)、フェルビナクパップ70(=セルタッチ)、ケトプロフェンパップ 100mg 等]			
虚血性心疾患用 貼付薬	硝酸イソソルビドテープ	40mg	1日1枚	
気管支拡張薬	ツロブテロールテープ	0.5mg 1mg 2mg	1日1枚	

【塗り薬】

鎮痛・消炎剤	フェルビナクスチック軟膏	40g/本		
外用ステロイド剤	ジフルプレドナート軟膏 (マイザー軟膏)	5g/本		
	ベタメタゾン吉草酸エステル 0.12%軟膏(リンデロンV軟膏)	5g/本		
	デルモゾール G 軟膏	5g/本		
	ヒドロコルチゾン酪酸エステル 軟膏 (ロコイド軟膏)	5g/本		
	オイラックス H クリーム	10g/本		
外用非ステロイド剤	アズノール軟膏	25g/本		
抗ウイルス剤	ビダラビン軟膏	5g/本		
口腔用軟膏	デキサメタゾン口腔用軟膏	5g/本		
眼科用軟膏	ネオメドロール EE 軟膏	5g/本		
抗真菌薬外用薬	※ニゾラルクリーム 各薬局の在庫状況で処方修正 願ひまたは処方提案の可能性 あり	10g/本	【白癬、皮膚カンジダ 症、癬風】1日1回 【脂漏性皮膚炎】 1日2回	市内在庫状況△
抗真菌薬爪外用 液	各薬局の在庫状況で処方修正願ひまたは処方提案の可能性あり			
抗生物質軟膏	ゲンタマイシン軟膏	10g/本		
痔疾患用軟膏	強力ポステリザン軟膏	2g/本		
保湿剤	ヘパリン類似物質油性クリーム	25g/本		

【座薬】

解熱鎮痛座薬	アルピニー座薬(後発品含む)	200mg	【備蓄薬局】海浜薬局、村原薬局、武田調剤薬局、 なぎさ薬局、大浦薬局、ばんせい薬局、	
便秘用座薬	新レシカルボン坐剤			
	テレミンソフト坐薬	10mg	常温保管	市内在庫状況△
消化器運動調節	ノウゼリン坐剤	10mg 30mg	1日2~3回 3歳↓は10mg	【備蓄薬局】海浜薬局、なぎさ薬局、村原薬局
<p>膣錠：オキナゾール膣錠 600mg(279.2円/錠) 1週1回1錠を膣深部に挿入 (100mgは1日1回6日継続) 30錠包装 有馬病院前のさつき薬局が備蓄</p>				

市内在庫状況△・・・市内22薬局中、半数以下9薬局以上備蓄

【点鼻薬】

フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液	27.5 μ g	56 噴霧用 112 噴霧用	1 日 1 回
-----------------------	--------------	----------------	---------

【吸入薬】

	医薬品名	規格	用法	備考
ステロイド	フルタイド	50 μ g 100 μ g 200 μ g 120 吸入、60 吸入	1 日 2 回	備蓄薬局少数
ステロイド・ β 2	アドエアディスカス	50mg 250mg 500mg	1 日 2 回 1 回 1 吸入	【備蓄薬局】 加世田しんあい薬局 クローバー薬局、ほん まち薬局、ばんせい薬 局、なぎさ薬局
	フルティフォーム		1 日 2 回 成人 1 回 2 吸入 小児 50 を 1 回 2 吸入	【備蓄薬局】 クローバー薬局、 武田調剤薬局、 ばんせい薬局、
発作時吸入薬	メプチンエアー	成人 1 回 2 吸入、小児 1 回 1 吸入 1 日 4 回 (原則として成人 8 吸入、小児 4 吸入) まで		

【眼科用薬／点眼薬、眼軟膏】

抗菌薬点眼液	レボフロキサシン点眼液	0.5% 1.5% 5 ml / 本	1 日 3 回	
抗炎症点眼液	フルメトロン点眼液	0.1% 5 ml / 本	1 回 1~2 滴、 1 日 2~4 回点眼	
	ヒアロンサン点眼液 0.1、0.3	5 ml / 本	1 日 5~6 回	
白内障用点眼液	ピレノキシリン点眼液	5 ml / 本		

緑内障治療点眼液 ★いろは薬局、加世田中央薬局で対応★

以下は参考品目 各薬局の在庫状況で処方修正願いまたは処方提案の可能性あり

房水産生抑制	チモプトール EX 点眼液	0.25% 0.5% 2.5ml / 本	1 日 1 回	
	ミケラン点眼液	LA 2% 1%、2%	1 日 1 回 1 日 2 回	
	ドルゾラミド点眼液	0.5% 1% 5 ml / 本	1 日 3 回	=トルソプト
房水排出促進	ラタノプロスト点眼液	2.5ml / 本		
緑内障配合点眼薬	ミケルナ配合点眼液 (カルテオロール・ラタノプロスト)	5 ml / 本	1 日 1 回	
	コソプト点眼液 (チモプトール・トルソプト)	5 ml / 本	1 日 2 回	2068.5 円 / 本
	アズルガ懸濁点眼液 (プリンゾラミド・チモロール)	5 ml / 本	1 日 2 回	1515 円 / 本
	デュオトラバ (チモプトール・トラバタンズ)	5 ml / 本	1 日 1 回	3385.5 円 / 本
	ザラカムは要冷蔵のため除外			
眼軟膏	タリビッド眼軟膏	3.5 g / 本	通常、1 日 3 回塗布	薬価 : 567.5 円 / 本
抗アレルギー薬 点眼液	オロパタジン点眼液	5ml / 本	1 日 4 回	薬価 : 235 円 / 本
	アレジオン点眼液	5ml / 本	1 日 4 回	薬価 : 522.4 円 / 本

【含嗽薬】

アズノールうがい液	5ml 10ml
-----------	----------

【注射薬】

持続型	インスリン グラルギン BS (遺伝子組換え) (=ランタス注ソロスター)	トレシーバ注フレックスタッチ
-----	--	----------------

【日本フォーミュラリ学会推奨】

持効型インスリンは糖尿病診療ガイドライン 2019 など国内外のガイドラインにおいて使い分けが明記されていない。本剤は、インスリン グラルギン (先行品) が多くの臨床試験で用いられており、エビデンスが集積していること、高齢者糖尿病診療ガイドライン 2017 に記載されている高齢糖尿病患者における検討では、インスリン デグルデクの重症低血糖の発現はインスリン グラルギンと同様だったと報告されていること、臨床試験で先行バイオ医薬品と同等性が認められたバイオシミラーも選択できることが特徴として挙げられる。インスリン グラルギン BS は有効性・安全性において他剤と差がなく、先行品より安価であることから第一推奨薬とした。

インスリン デグルデク (トレシーバ®注フレックスタッチ)、インスリン デテミル (レベミル®注フレックスペン)
インスリン デグルデク(トレシーバ)は、小児用量が設定されていること、作用持続時間が長く、低血糖の発現がインスリン グラルギンよりも少ないことが報告されていることから、小児やインスリン グラルギンでコントロール不良な患者に使用する。開封後に最長 8 週間まで室温で保存できるため、災害等の理由により冷所で保管できない場合にも利便性が高いことが特徴として挙げられる。インスリン デテミル(レベミル)は、妊婦に対するエビデンスを有し、医薬品の胎児に対するリスク分類基準のオーストラリア分類で唯一 A とされていることが特徴として挙げられることから、妊婦に使用する場合のオプションとする。補足；レベミル 1 日 2 回

混合型	ヒューマログミックス 25 注ミリオペン	【備蓄薬局】 海浜薬局、村原薬局、ほんまち薬局、東本町薬局
-----	----------------------	----------------------------------

速攻型	日本フォーミュラリ学会推奨	
	インスリン リスプロ BS 注 (遺伝子組換え) (=ヒューマログ注ミリオペン)	インスリン アスパルト BS 注 (遺伝子組換え) (=ノボラピッド注フレックスタッチ)
	超速効型インスリンは糖尿病診療ガイドライン 2019 など国内外のガイドラインにおいて使い分けが明記されていない。また、インスリン リスプロ、インスリン アスパルトの有効性・安全性の違いを示した報告はない。本剤は、小児適応を有すること、「妊娠糖尿病」に対する使用が診療報酬支払基金の審査上認められていること、医薬品の胎児に対するリスク分類基準のオーストラリア分類で A とされていること、臨床試験で先行バイオ医薬品と同等性が認められたバイオ後続品であることが特徴として挙げられる。インスリン リスプロは有効性・安全性において他剤と差がなく、先行品より安価である	本剤は、小児適応を有すること、「妊娠糖尿病」に対する使用が診療報酬支払基金の審査上認められていること、医薬品の胎児に対するリスク分類基準のオーストラリア分類で A とされていること、臨床試験で先行バイオ医薬品と同等性が認められたバイオ後続品であることが特徴として挙げられる。インスリン アスパルト BS はインスリン リスプロの先行品および BS のいずれよりも薬価が高いことから、同一成分の先行品からの切替は推奨できるが、新規に投与する場合はインスリンリスプロ製剤の処方推奨される

持続性 GLP-1 作動薬	トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス	週に 1 回、皮下注射 忘れた場合は、次回投与までの期間が 3 日間 (72 時間) 以上であれば気づいた時点で直ちに投与しその後は予め定めた曜日に投与、3 日間 (72 時間) 未満であれば投与せず次の予め定めた曜日に投与する	【備蓄薬局】 海浜薬局、さつき薬局、武田調剤薬局、東本町薬局、なぎさ薬局
---------------	--------------------------	---	---

マイクロファインプラス	3 1G 3 2G	
ナノパスニードル	3 3G 3 4G	

【地域医療材料備蓄・供給拠点薬局】

当地域主催の医療材料研修を受講し、かつ高度管理医療機器の許可のある薬局としている。

南さつま市	海浜薬局	村原薬局	かささ薬局	坊津薬局
-------	------	------	-------	------

役割：各市において、当該薬局が訪問看護ステーション及び患者様等に対しての医療材料取扱い窓口となり、在宅療養の際に必要な医療材料の相談、供給にあたる。

取り扱い品目リスト

品目	規格	販売単位	税込み価格
シリンジ 針無・横口	20ml、 50ml、	1本 1本	80円 100円
ロックタイプ シリンジ	30ml	1本	80円
サフフィード 吸引カテーテル 先端開口 2孔式	気管内挿入用 30cm 6Fr 口腔・鼻腔用 28cm 10Fr 口腔・鼻腔用 40cm 12Fr 口腔・鼻腔用 50cm 14Fr	1本	60円 80円 100円 100円
カニューレ用ブラシ		1本	250円
自発呼吸用人工鼻サーモベントT		1個	720円
ウロガードプラス(尿バッグ)	閉塞式導尿バッグ/新鮮尿採取口付 逆流防止弁付 2500ml	1個	450円
ストーマパウチ セルケア1・TD	袋サイズ(縦×横)：300mm×150mm	1枚	700円
テガダーム スムーズフィルムロール	幅：15cm	50cm	250円
けんだくボトル	100ml	1個	85円
栄養セット (胃瘻用)		1セット	150円
栄養ボトル	600ml	1個	420円
EN変換コネクタ		1個	200円

●上記以外の品目も随時ご相談に応じます

〈医材販可〉のマークが記載されている薬局においても注文受注できますので、上記備蓄品以外の品目もご相談ください。



ロックタイプ



テルモ ロックタイプシリンジ 《30ml》 80円/本

●緊急避妊薬取り扱い薬局

●南さつま市 緊急避妊薬取り扱い薬局

薬局名	連絡先
武田調剤薬局	0993-58-2077 / 緊急・夜間 090-8415-2077
海浜薬局	0993-76-8115 / 緊急・夜間 左記→転送
村原薬局	0993-58-2115 / 緊急・夜間 090-1928-8931
さつき薬局	0993-52-4193 / 緊急・夜間 090-8663-6513
加世田しんあい薬局	0993-52-6070 / 緊急・夜間 同一
いろは薬局	0993-58-2323 / 緊急・夜間 090-2096-0927
ほんまち薬局	0993-52-1012 / 緊急・夜間 同一→転送
クローバー薬局	0993-76-0076 / 緊急・夜間 090-5482-9141
なぎさ薬局	0993-58-4025 / 緊急・夜間 同一
田布施薬局	0993-77-2666 / 緊急・夜間 080-2786-5477
坊津薬局	0993-59-4050 / 緊急・夜間 090-7159-2959
南さつまマリンバ薬局	0993-52-0660 / 緊急・夜間 同一
大浦薬局	0993-62-4555 / 緊急・夜間 090-1973-1937

●一般用医薬品48薬効群常備薬局

(※様々な疾患に対応できる一般用医薬品を常備している薬局)

●南さつま市

薬局名	連絡先
武田調剤薬局	0993-58-2077 / 夜間 090-8415-2077
海浜薬局	0993-76-8115 / 夜間 同一→転送
村原薬局	0993-58-2115 / 夜間 090-1928-8931
なぎさ薬局	0993-58-4025 / 夜間 同一
加世田しんあい薬局	0993-52-6070 / 夜間 同一
ばんせい薬局	0993-52-0105 / 夜間 同一
ほんまち薬局	0993-52-1012 / 夜間 同一→転送
南さつまマリンバ薬局	0993-52-0660 / 夜間 同一
大浦薬局	0993-62-4555 / 夜間 090-1973-1937
田布施薬局	0993-77-2666 / 夜間 080-2786-5477
坊津薬局	0993-59-4050 / 夜間 090-7159-2959